ሥርዓተ ጸሎት ዘዓመ ፀሐይ ነሐ

ሥርዓተ ጸሎት ዘዓመ ፀሐይ ነሐ ... ገጽ ... ...

1.1 პროგრამირების ენების და ალგორითმები

ცხრილი 2

ზღვიერი სასოთოლო-სამეურნეო კოოპერატივის ინერციაზიალური

[redacted]

ცალკეული აგროეკოსისტემები ხასიათდება გარეშე ანთროპოგენური

[illegible] (Polygonum convolvulus) [illegible]

[illegible] (Sinapis arvensis) [illegible] (Raphanus raphanistrum)



[illegible]	[illegible]


ნიადაგი
მდინარეები
და ტბები
ოკეანე
ბალიხის
მჭამელი
ცხოველები

[redacted]

ლაბორა-

ცალმხრივობის 70 %-ს ამ წიგნის ბარიტებში ფოტოგრაფიული ინ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ზრდა და ეანვითარება.

მოსაავოს_და მის ხარისხს.

ყველა სახის ორგანული ნარჩენის გამოყენების შემთხვევაში.

δοσσ.

ადგილური ხსნარის რეაქცია და შემადგენლობა. ნიადაგური ჯოლი-

ბა

ბის

გაარკვია;

[illegible]

პირობები“-ს ერთიან სისტემაში;



მოქმედებას;

[illegible] (Phaseolus vulgaris Savi) [illegible]

სხვ.

ფესვოვან ლოკოზორათა შორის ბაშოი ოთრო მიზად ყინვაგამძლეა.

[illegible]

ძირითადად ზოვის დონიდან 1300-1700 მ სიმაღლეებში. მშრალი

საშუალოდ თერმობიბით ესენი აღწევენ 2200-2300 მეგზრამდე. ხოლო

ვალებით. მსოფლიო მიწათმოქმედების პრაქტიკაში ავრცელებს-

[illegible]

ლიტერატურა

ბაფრიშვილი ვ. მიმოინარეობა. "განათლება". თბილისი. 1981.

Мирхцулава П.Е. Основы физики и механики эрозии русел. Л., 1988

Environment. Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1989

სარჩევი

[illegible] 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

და საკარგულების აგროეკოლოგიური თავისებურებანი . . 271